

Przygotowanie do badania rektoskopii

Na 2 dni przed badaniem:

- Należy stosować lekkostrawną dietę (z wyłączeniem ciemnego pieczywa, owoców, potraw wzdymających).
- Wskazane jest wypicie dużej ilości płynów (około 3 litry w ciągu doby).

Na 1 dzień przed badaniem:

- Należy utrzymać lekkostrawną dietę
- Wieczorem należy wykonać wlew doodbytniczy z preparatu ENEMA zgodnie z zaleceniami producenta na załączonej ulotce (preparat dostępny w aptece bez recepty).

W dzień badania:

Badanie zaplanowano w godzinach popołudniowych, w dniu badania rano można pić, jednak ostatni płyn może być wypity nie później niż 7-8 godzin przed zaplanowanym terminem badania. W przypadku kiedy pacjent przyjmuje leki np. z powodu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca lub cukrzycy proszę przyjąć leki i popić niewielką ilością wody.

Taka procedura przygotowania do badania ma na celu oczyszczenie jelita grubego. Nie stosowanie się do w/w zaleceń uniemożliwia wykonanie badania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z rejestracją doktorA:22 205 08 01.